

# Артикаин Inibsa

*Ваша  
профессиональная  
уверенность*



современный, высокоэффективный  
и малотоксичный местный анестетик

высокая местноанестезирующая  
активность и продолжительность  
обезболивающего эффекта

снижает риск системной токсичности  
по сравнению с другими местными  
анестетиками

 **inibsa**  
DENTAL

# Артикаин Inibsa 1:100 000

Артикаин Inibsa 1:100 000 – достижение контроля над болью при использовании минимально необходимого количества анестетика



ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ  
ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ  
**60-75 мин.**



быстрое действие: необходимый эффект достигается через 1,5-2 мин. после инъекции



минимум противопоказаний и побочных реакций



надежный обезболивающий эффект при хорошей тканевой переносимости



## Описание

Препараты артикаина с концентрацией эпинефрина 1:100 000 используются при длительных и травматичных стоматологических вмешательствах, требующих пролонгированного обезболивания и активного гемостаза для уменьшения кровоточивости при их проведении.

Артикаин Inibsa 1:100 000 местноанестезирующее средство, обеспечивающее высокую степень эффективности и безопасности.

**Состав:** 1 мл препарата содержит артикаина гидрохлорид 40 мг, эпинефрина гидротартрата 0,018 мг в пересчете на эпинефрин (адреналин) 0,010 мг.  
**Упаковка:** коробка 100 картриджей по 1,8 мл.

## Применение

Артикаин Inibsa 1:100 000 используется при проведении инфильтрационной, проводниковой, интралигаментарной, интрасептальной и внутрипульпарной анестезии для обезболивания травматичных стоматологических вмешательств:

- при травматических вмешательствах
- при необходимости выраженного гемостаза или улучшения визуализации операционного поля;
- стоматологические операции на слизистой оболочке или костях, требующие создания условий более выраженной ишемии: операции на пульпе зуба (ампутация или экстирпация);

- удаление сломанного зуба (остеотомия) или зуба, пораженного апикальным пародонтитом;
- продолжительные хирургические вмешательства; чрескостный остеосинтез, эксцизия кист;
- вмешательства на слизистой оболочке десны;
- резекция верхушки корня зуба

**Высокая способность проникновения в мягкие и костные ткани создаёт длительный анестезирующий эффект.**



*Ваша профессиональная уверенность*

**inibsa**  
DENTAL

# Артикаин Inibsa

## 1:200 000

Артикаин Inibsa 1:200 000 – оптимальное сочетание артикаина и эпинефрина для большинства стоматологических вмешательств



ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ  
ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ  
**45-60 мин.**



быстрое действие: необходимый эффект достигается через 1,5-3 мин. после инъекции



минимум противопоказаний и побочных реакций



надежный обезболивающий эффект при хорошей тканевой переносимости



### Описание

4 % раствор артикаина Inibsa 1:200 000 не уступает по анестезирующей активности 4 % раствору артикаина Inibsa 1:100 000. В большинстве случаев для обезболивания в стоматологической практике применяется артикаин с концентрацией эпинефрина 1:200 000. Артикаин Inibsa 1:200 000 – активный и малотоксичный местный анестетик, имеющий оптимальное соотношение артикаина и эпинефрина и большую широту терапевтического действия, что снижает риск передозировки препарата.

**Состав:** 1 мл препарата содержит артикаина гидрохлорид 40 мг, эпинефрина гидротартрата 0,009 мг в пересчете на эпинефрин (адреналин) 0,005 мг.  
**Упаковка:** коробка 100 картриджей по 1,8 мл.

### Применение

Артикаин Inibsa 1:200 000 используется при проведении инфильтрационной, проводниковой, интралигаментарной, интрасептальной и внутрипульпарной анестезии для обезболивания травматических стоматологических вмешательств. При стандартных вмешательствах таких как препарирование кариозных полостей, при проведении прямой реставрации зубов, раскрытие полости зуба при остром и обострившемся периодонтите, снятие зубных отложений при гингивите и пародонтите:

- неосложнённое удаление одного или нескольких зубов;
- препарирование кариозных полостей;

- обтачивание зубов перед протезированием;
- при проведении прямой реставрации зубов;
- раскрытие полости зуба при остром и обострившемся периодонтите;
- снятие зубных отложений при гингивите и пародонтите

**Низкая токсичность артикаина и большая широта терапевтического действия делают его препаратом выбора у детей, беременных, и лиц пожилого возраста.**

*Ваша профессиональная уверенность*

**inibsa**  
DENTAL

# Скандинибса мепивакаин 3%

Скандинибса 3% -  
рекомендуется для тех  
пациентов, которым  
противопоказано  
применение местных  
анестетиков  
с вазоконстриктором



ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ  
ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ  
**20-40 мин.**



быстрое действие: необходимый эффект достигается  
через 2-3 мин. после инъекции



минимум противопоказаний и побочных реакций



надежный обезболивающий эффект при хорошей тканевой  
переносимости



## Описание

Для пациентов с сердечно-сосудистой недостаточностью, сахарным диабетом, гипертонической болезнью, тиреотоксикозом, а также пациентов, проходящих курс лечения антидепрессантами разработан специальный анестетик - Scandibsa (мепивакаина гидрохлорид 3%) без вазоконстриктора. Скандинибса не оказывает сосудорасширяющего действия, что делает его препаратом выбора у пациентов с повышенной чувствительностью к вазоконстрикторам.

**Состав:** 1 мл препарата содержит мепивакаина гидрохлорид 30 мг.  
**Упаковка:** коробка 100 картриджей по 1,8 мл.

## Применение

Специальный анестетик – Скандинибса (мепивакаина гидрохлорид 3%) без вазоконстриктора применяется для местной анестезии при различных терапевтических и хирургических вмешательствах в полости рта:

- смазывание слизистых оболочек при интубации трахеи, бронхоэзофагоскопии, тонзиллэктомии;
- для пациентов с сердечно-сосудистой недостаточностью;
- для пациентов с сахарным диабетом;
- для пациентов с гипертонической болезнью;

- для пациентов с тиреотоксикозом;
- для пациентов проходящих курс лечения антидепрессантами

Рекомендуется для любого типа кратковременных терапевтических вмешательств, в частности для больных артериальной гипертензией, а также для больных, страдающих коронарной недостаточностью и диабетом.

**Минимальный вазодилатирующий эффект позволяет использовать данный анестетик сводя к минимуму нагрузку на сердечно-сосудистую систему.**

*Ваша профессиональная уверенность*

**inibsa**  
DENTAL



**Артикаин Inibsa -  
самый современный,  
высокоэффективный  
и малотоксичный  
местный анестетик.  
Признанный мировой  
лидер - объём продаж  
более 250 000 000  
карпул в год.**

#### **Артикаин Inibsa -**

стандарт стеклянных карпул с местным анестетиком, который создаётся с применением передовых технологий производства

#### **Артикаин Inibsa -**

производится на современном высокотехнологичном оборудовании, которое позволяет обеспечить безупречное качество и гарантирует безопасность выпускаемой продукции

#### **Артикаин Inibsa -**

обладает высокой местноанестезирующей активностью и продолжительностью обезболивающего эффекта, а также снижает риск системной токсичности артикаина по сравнению с другими местными анестетиками

#### **RUSPHARM —**

- официальный партнёр компании Inibsa Dental по разработке и производству местных анестетиков и эксперт в производстве одноразовых стоматологических карпульных инъекторов ARTIJECT
- испано-российская медицинская компания-производитель оптимальных решений для безопасной и эффективной местной анестезии
- официальный дистрибьютор анестетиков Inibsa Dental в России

ООО «РусФарм»  
Россия, 125315, г. Москва,  
ул. Часовая, 24  
Тел.: +7 (495) 504 10 64  
E-mail: [info@inibsa.ru](mailto:info@inibsa.ru)  
[www.inibsa.ru](http://www.inibsa.ru)  
[www.artiject.ru](http://www.artiject.ru)

 **inibsa**  
DENTAL